EMC CHILDREN'S CLINIC

ДЕТСКАЯ КЛИНИКА
ЕВРОПЕЙСКОГО
МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА

ВАШ КАЛЕНДАРЬ ЗДОРОВЬЯ

Возраст	24 часа	3-7 д	1 м	2 м	3 м	4-4,5 м	5 м	6 м	7 м	8 м	9 м	10 м	11 м	12 м
Специалисты														
Педиатр	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Невролог			■											■
Детский хирург			■											
Офтальмолог (проверка на движение глазных яблок, симметрия)			■											
Детский стоматолог – по желанию родителей (проверка десен, готовность к прорезыванию зубов, проф. консультация по проблемам прорезывания зубов)			■											
Травматолог-ортопед					■	■								
Детский хирург (пальпация живота, образования на мягких тканях, грыжевые выпирания, осмотр гениталий)														■
Оториноларинголог														■
Травматолог-ортопед (смотрит опорно-двигательный аппарат, суставы, деформацию скелета)														■
Офтальмолог														■
Врач-генетик	По назначению													
Врач-фтизиатр														
Врач ЛФК														
Обследования														
Реакция Манту в возрасте с 12 месяцев, ежегодно														■
Неонатальный скрининг на врожденный гипотиреоз, фенилкетонурию, адреногенитальный синдром, муковисцидоз и галактоземию	■													
Аудиологический скрининг (если не делали в роддоме)	■			■										
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)		■												
Ультразвуковое исследование почек		■												
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов		■												
Эхокардиография		■												
Нейросонография		■												
Общий анализ крови			■											■
Общий анализ мочи			■											■
Электрокардиография														■
Вакцинация														
Первая вакцинация против вирусного гепатита В (выполняется только в Роддоме EMC)	■													
Вакцинация против туберкулеза (выполняется только в Роддоме EMC)		■												
Вторая вакцинация против вирусного гепатита В			■											
Третья вакцинация против вирусного гепатита В (группы риска)				■										
Первая вакцинация против пневмококковой инфекции				■										
Первая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка					■									
Первая вакцинация против полиомиелита					■									
Первая вакцинация против гемофильной инфекции (группы риска)					■									
Вторая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка						■								
Вторая вакцинация против гемофильной инфекции (группы риска)						■								
Вторая вакцинация против полиомиелита						■								
Вторая вакцинация против пневмококковой инфекции						■								
Третья вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка								■						
Третья вакцинация против полиомиелита								■						
Третья вакцинация против гемофильной инфекции (группа риска)								■						
Третья вакцинация против вирусного гепатита В								■						
Вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита														■
Четвертая вакцинация против вирусного гепатита В (группы риска)														■
Гепатит А в возрасте с 12 месяцев, 2 дозы (минимальный промежуток между дозами 5-12 месяцев) (Хаврикс)														■
Менингококк Если ребенок начал прививаться в возрасте 9-24 мес. – 2 дозы (минимальный промежуток между дозами 30-45 дней);Если ребенок начал прививаться в возрасте с 24 месяцев – 1 доза											■			
Ветряная оспа в возрасте с 12 месяцев, 2 дозы (минимальный промежуток между дозами 30-45 дней)														
Ротавирус в возрасте с 6 до 32 недель максимум, 3 дозы (рекомендуемый промежуток между дозами 4-6 недель)				■		■		■						
Грипп с 6 месяцев ежегодно, первая доза вводится двукратно, минимальный промежуток между дозами 1 месяц								■						